

Prevención del embarazo

Las consecuencias de un embarazo no deseado son muchas, y la mayoría ocurre en la adolescencia.




Solo existen dos formas para evitar un embarazo no deseado. La **abstinencia total** o el **uso de anticonceptivos**.

La Organización Mundial de la Salud fija los límites de la adolescencia **entre los 10 y 20 años.**

Uno de cada seis nacimientos en México ocurre en mujeres menores de 19 años.

Según el INEGI durante el año 2000 sucedieron en el país cerca de **366 mil nacimientos** de madres de 15 a 19 años.

La UNESCO indica que las madres muy jóvenes (especialmente las menores de 15 años) tienen una mortalidad materna 2.5 veces mayor que las de 20 a 24 años.

El porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el total de nacimientos en 1958 era del 11.2%.

A finales del siglo XX el porcentaje de hijos de madres adolescentes sobre el de nacimientos en era del 15%.

Estados Unidos es el país industrializado con mayor tasa de embarazadas adolescentes.

Mantener relaciones sexuales conlleva responsabilidad. Lo ideal es abstenerse hasta tener la **madurez** para entender su significado y consecuencias .



Métodos anticonceptivos

Mortalidad materna

83.9% del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionan con el embarazo, parto y/o puerperio.

70% de las muertes maternas adolescentes se presentaron bajo atención médica.









Desde 2010 hay un alza sostenida de la mortalidad materna en adolescentes.

Educación de las mujeres adolescentes con hijas/os

59% de las adolescentes con antecedente de embarazo sólo cursó hasta la secundaria.

Repercusión en la economía

33% de las mujeres de 20 a 24 años que fueron madres adolescentes en México, se encuentran en el quintil más pobre.

IMPLANTES	DIU	PÍLDORA	CONDÓN MASCULINO
 <p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben ser colocados por un proveedor de atención médica. • Duran hasta 3 años. 	 <p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben ser colocados por un proveedor de atención médica. • Los DIU de cobre duran hasta 10 años. • Los DIU de progesterona duran de 3 a 5 años. 	 <p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben tomarse cada día a la misma hora. 	 <p>Cómo usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben usarse correctamente cada vez que se tengan relaciones sexuales.
 <p>Probabilidades de embarazo: Menos de 1 en cada 100 mujeres.*</p>	 <p>Probabilidades de embarazo: Menos de 1 en cada 100 mujeres.*</p>	 <p>Probabilidades de embarazo: 9 en cada 100 mujeres.*</p>	 <p>Probabilidades de embarazo: 18 en cada 100 mujeres.*</p>
MÁS EFICAZ		MENOS EFICAZ	